



WOMEN'S HEALTH ADVANTAGE

CUIDADOS DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA GINECOLÓGICA MENOR (VULVAR/PERINEAL)

Esta hoja de instrucciones le brinda información sobre cómo cuidarse después de la cirugía. Si tiene algún problema o pregunta, llame a Women's Health Advantage al **260-432-4400** durante el horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.

Lo que puede esperar después de la cirugía

Después de la cirugía, es común tener:

- Dolor de garganta si tuvo anestesia general (debido al tubo de respiración que se usó)
- Fatiga
- Poco apetito
- Dolor/malestar vaginal, sangrado vaginal leve y picazón en las áreas de cicatrización. El sangrado y las molestias deben continuar mejorando cada día. Use toallas higiénicas o protectores diarios sin perfume.

Actividad

- No conduzca ni opere maquinaria peligrosa mientras toma analgésicos recetados (narcóticos). Si no está tomando analgésicos recetados, puede conducir después de 24 horas.
- Evite abrir las piernas más que el ancho de los hombros, especialmente al subir a un automóvil y al entrar y salir de la bañera.
- Evite las actividades extenuantes y el levantamiento de objetos pesados durante 1 semana.
- Puede ducharse tan pronto como lo desee. Al secar el área de cicatrización, recuerde secar con mucha suavidad.
- Al día siguiente del procedimiento, puede remojar el área afectada en una tina limpia con agua tibia 2 a 3 veces al día durante 15 minutos por vez. Evite remojar durante largos períodos de tiempo en agua caliente o jabonosa.
- Evite el jabón perfumado, los desodorantes femeninos o los polvos de talco.
- Evite usar pantalones o ropa interior ajustados, y use solo ropa interior de algodón.
- No tenga relaciones sexuales durante al menos 4 semanas, y solo cuando lo apruebe su médico en su cita posoperatoria.

Dieta

- Puede reanudar su dieta habitual.
- Las náuseas son comunes después de la cirugía y generalmente desaparecen en un plazo de 48 horas.
- Si tiene náuseas después de la cirugía, intente ingerir comidas pequeñas y frecuentes. También intente llevar una dieta blanda, como galletas saladas, pretzels, tostadas, gelatina, batidos de proteínas, avena, yogur, arroz, caldo de pollo, puré de manzana y plátanos. Puede tomar un par de días para que su apetito vuelva a la normalidad.
- Si tiene náuseas o vómitos persistentes, comuníquese con el consultorio.
- Beba suficiente agua para mantener la orina clara o de color amarillo pálido.

Medicamentos

- Puede reanudar inmediatamente la toma de sus medicamentos habituales.
- Es posible que se le haya enviado a su farmacia una receta para un analgésico narcótico. Puede usarlo junto con ibuprofeno (es decir, Motrin o Advil) 600 mg cada 6 horas u 800 mg cada 8 horas.
- Las recetas de narcóticos con frecuencia contienen acetaminofén (es decir, Tylenol), así que no use Tylenol mientras toma el medicamento narcótico a menos que un médico o farmacéutico le diga que está bien hacerlo.
- Si no tiene una receta de narcóticos, puede usar Tylenol Extra Strength 1000 mg cada 6 horas y alternarlo con ibuprofeno.
- No tome más de 2400 mg de ibuprofeno o 4000 mg de Tylenol en un período de 24 horas.

Evite el estreñimiento

- Beba bastante líquido.
- Los analgésicos narcóticos, así como la anestesia, pueden causar estreñimiento. Si siente que se ha estreñado o si ha pasado más de un día desde su última evacuación intestinal, le recomendamos tomar Colace o Miralax como se indica en el frasco y/o aumentar los alimentos ricos en fibra en su dieta, como ciruelas pasas, manzanas, pasas, peras y jugo de manzana.
- Si no ha defecado al tercer día después de la cirugía, puede usar Leche de Magnesio como se indica en el frasco.

Cosas con las que hay que mantenerse alerta

- | | |
|--|---|
| • Fiebre, definida como una temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más | • Dolor en el pecho y/o dificultad para respirar |
| • Aumento del dolor no controlado por su analgésico | • Náuseas o vómitos que no desaparecen |
| • Sangrado vaginal que empapa más de 1 toalla higiénica por hora | • Dolor persistente o sangrado al orinar, o incapacidad para orinar |
| • Flujo vaginal con mal olor o de color verde/amarillo | • Dolor, enrojecimiento y/o hinchazón en la pierna |

Si tiene alguno de los problemas mencionados, llame a Women's Health Advantage al **260-432-4400** durante el horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes. Si le preocupa alguno de sus síntomas o si el consultorio está cerrado, busque atención en un departamento de emergencias.